

# ОВОСТОП®-К

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по ветеринарному применению лекарственного препарата ОВОСТОП®-К**  
Согласовано Заместителем Руководителя Россельхознадзора Савенковым К.А.  
(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агриветзащита», Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2).

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-10.15-2881№ПВР-3-10.15/03197

## I. Общие сведения

Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: ОВОСТОП®-К (Ovostop-K).

международные непатентованные наименования действующих веществ: ципротерон, пророксан, мелатонин.

Лекарственная форма: суспензия для наружного применения.

ОВОСТОП®-К в 1 мл содержит в качестве действующих веществ ципротерона ацетат – 11 мг, пророксан – 16,5 мг и мелатонин - 110 мг, а также вспомогательные вещества: триацетин, изопропилен глицерол, N,N-диэтилтолуамид, ПЭГ-токоферол, кислота стеариновая, ПЭГ-ланолин, Д-пантенол.

По внешнему виду препарат представляет собой мелкодисперсную суспензию от светло-желтого до темно-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. Запрещается применять по истечении срока годности.

Выпускают ОВОСТОП®-К расфасованным по 1, 2 и 4 мл в полимерные пипетки-капельницы; по 1, 2, 4, 6, 8 мл в полимерные тубы и флаконы-капельницы с навинчиваемой крышкой. Полимерные пипетки-капельницы и тубы упаковывают по 1, 2, 3 и 4 штуки, флаконы-капельницы по 1 и 2 штуки в картонные пачки и блистеры из комбинированных материалов. Допускается индивидуальная фасовка пипеток-капельниц, туб и флаконов-капельниц в полимерные пакеты перед помещением в картонные пачки. Каждая потребительская упаковка сопровождается инструкцией по применению препарата.

Хранят ОВОСТОП®-К в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 25 °С.

ОВОСТОП®-К следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

ОВОСТОП®-К относится к комплексным гормональным препаратам.

Механизм действия ципротерона ацетата, входящего в состав препарата, заключается в воздействии на гипоталамо-гипофизарную систему, блокаде секреции аденогипофизом гонадотропных гормонов и снижении синтеза эндогенных андрогенов.

Пророксан блокирует постсинаптические  $\alpha$ 1- и пресинаптические  $\alpha$ 2-адренорецепторы. Центральное аденолитическое действие пророксана сопровождается блокированием реакций вызванных стимуляцией задних ядер гипоталамуса в состоянии полового возбуждения – вокализации, поиска полового партнера, агрессивности и т.д. Мелатонин является синтетическим аналогом гормона эпифиза. Нормализует биологические ритмы и оказывает адаптогенное действие.

Одновременное воздействие на организм животного ципротерона, адптогена мелатонина и центрального аденолитика пророксана блокирует процессы, связанные с возникновением состояния полового возбуждения, в структурах ЦНС и на гормональном уровне. Однократное нанесение препарата в вечернее время быстро подавляет как поведенческие половые реакции животных, за счет прямого тормозящего воздействия пророксана на задние ядра гипоталамуса, ответственные за формирование полового поведения, так и продукцию гонадотропинов гипофизом. Продолжительность эффекта после однократного применения препарата составляет 3-4 месяца в период длинного светового дня и до 6 месяцев – в период короткого светового дня.

При накожном применении компоненты препарата проникая в системный кровоток, метаболизируются в печени и в виде глюкуроновых солей выводится из организма животных с мочой и калом.

По степени воздействия на организм ОВОСТОП®-К относится к группе малоопасных веществ (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

**ОВОСТОП®-К применяют котам и кобелям для снижения половой активности и коррекции нежелательного поведения (повышенная агрессивность и вокализация, поиск полового партнера, мечение территории мочой).**

Применение препарата ОВОСТОП®-К показано животным при заболеваниях мочеполовой системы, лимфоме, лимфогранулематозе,

лейкозе, миеломе, сахарном диабете, гормональных нарушениях, аллергических заболеваниях, аутоиммунных заболеваниях, эпилепсии, хронической почечной недостаточности и индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.

При работе с препаратом ОВОСТОП®-К следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ОВОСТОП®-К. Не следует прикасаться к месту нанесения лекарственного препарата и подпускать животное к маленьким детям в течение 48 часов после обработки. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается применение препарата ОВОСТОП®-К кошкам и сукам, а также неполовозрелым животным.

**ОВОСТОП®-К применяют однократно в вечернее время путем капельного нанесения на сухую неповрежденную кожу в области спины между лопатками или в области шеи, у основания черепа, в дозе 1 мл на kota вне зависимости от массы тела. Кобелям, с учетом массы тела, выбирают фасовку необходимого объема или их комбинации и применяют препарат в дозах, указанных в таблице.**

Масса тела собаки, кг	Количество мл на животное
менее 5	1
от 5 до 15	2
от 15 до 35	4
от 35 до 50	6
более 50	8

В случае отсутствия эффекта в течение 24 часов препарат наносят повторно в той же дозе.

Не следует мыть и купать животное в течение 48 часов перед и после обработки, а также наносить лекарственный препарат на влажную или поврежденную кожу.

Эффект однократного применения препарата более длительный (до 4-6 месяцев) при коротком световом дне (в осенне-зимний период) и у молодых животных; при длительном световом дне (весенне-летний период) эффект продолжается в течение 3-4 месяцев.

При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможно повышение массы тела, а также появление незначительного угнетения и сонливости. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают, препарат смывают с помощью моющих средств, животному назначают антигистаминные и симптоматические средства.

В случае передозировки возможно незначительное повышение массы животного, усиление аппетита, апатичность. При значительной передозировке специфическим антидотом являются адреномиметики, которые вводят для нормализации артериального давления.

Не следует применять ОВОСТОП®-К совместно с гормональными лекарственными препаратами, альфа-адреноблокаторами и нейролептиками (производные фенотиазина, бутирофенона, дифенилбутилпиперидина, тиоксантена). Информация о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп, кормовыми добавками и кормами отсутствует.

Особенностей действия препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

Лекарственный препарат применяется однократно.

Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.



Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1. Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).

Информация о лекарственном препарате размещена на сайте [www.avzet.ru](http://www.avzet.ru)