

Утверждаю:
Зам. Председателя Комитета
ветеринарного контроля и надзора
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан



Аусабаев О.А.

« 18 » 01 2018

ИНСТРУКЦИЯ

для применения Хлорэксидерм шампунь 4% для профилактики кожных заболеваний различной этиологии кошек и собак.

(организация - разработчик: ««I.C.F. S.r.l. Industria Chimica Fine» Италия)

Глава 1. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата:

Хлорэксидерм шампунь 4% (Clorexuderm Shampoo 4%).

Международное непатентованное наименование: хлоргексидин.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Препарат в 1 мл в качестве действующего вещества содержит: хлоргексидина диглюконат - 40 мг, а в качестве вспомогательных веществ: этоксилат изодецилового спирта, пропиленгликоль, глицерин, диметилалкилоксид, ланолина этоксилат, гидроксипропилцеллюлоза, отдушка, бирюзовый кемазол, деионизированная вода.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость зеленоватого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства.

Запрещается применение Хлорэксидерм шампунь 4% по истечению срока годности. Выпускают препарат во флаконах по 250 мл упакованных поштучно в картонные пачки в комплекте с инструкцией по применению.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Хлорэксидерм шампунь 4% следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

Глава 2. Порядок применения

1. Применение Хлорэксидерм шампунь 4% необходимо проводить под контролем ветеринарного врача.

Хлорэксидерм шампунь 4% назначают собакам и кошкам с лечебной и/или профилактической целью при бактериальных (поверхностных и глубоких пиодерматитах), грибковых (малассезиозах и дерматофитозах), смешанных и атопических поражениях кожи и её производных.

Хлорэксидерм шампунь 4% относится к антисептическим лекарственным препаратам.

Хлоргексидина диглюконат, входящий в состав препарата, является дихлорсодержащим производным бигуанида, обладает выраженным противомикробным действием, активен в отношении вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов. На споры бактерий действует только при повышенной температуре.

Механизм действия хлоргексидина заключается во взаимодействии с фосфатными группами на поверхности бактериальной клетки, вследствие чего возникает смещение осмотического равновесия, нарушение целостности и гибель клетки. После мытья шампунем остаточное бактерицидное действие на коже сохраняется до 24 часов.

Не обладает кожно-резорбтивным действием.

Хлорэксидерм шампунь 4% по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам, в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического и сенсибилизирующего действия. При попадании в глаза вызывает слабое раздражение.

Хлорэксидерм шампунь 4% применяют путем равномерного нанесения на смоченную теплой водой шерсть животного из расчета 1 мл на 1 кг массы животного, втирая массирующими движениями до образования пены, избегая попадания на слизистые оболочки. Через 5-10 минут шампунь тщательно смыть теплой водой, шерсть высушить и расчесать.

Для оптимального терапевтического эффекта применение препарата необходимо повторять каждые 3-5 дней, в зависимости от патологии, как минимум 3-4 недели.

2. Особых условий содержания в период и после применения препарата не требуется.
3. Сведения о взаимодействии препарата с ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.
4. При наружном применении случаи передозировки неизвестны. При случайном попадании внутрь практически не абсорбируется (следует сделать промывание желудка, используя молоко, сырое яйцо или желатин). При необходимости проводится симптоматическая терапия.
5. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.
6. Не допускается применение препарата животным моложе 3-х недельного возраста.
7. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее.
8. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. Следует избегать попадания шампуня в глаза и уши животного.
9. Хлорэксидерм шампунь 4% не предназначен для применения продуктивным животным.
10. Ветеринарный отчет и порядок предоставления отчетности по применению ветеринарного препарата следует вести с учетом местного законодательства.
11. В случае выявления осложнений или побочных эффектов необходимо сообщить в уполномоченные органы.