



ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Чистотел Максимум капли

(Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл., г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-16.16-3532№ПВР-3-3.7/01974

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Чистотел Максимум капли.
Международные непатентованные наименования действующих веществ: фипронил, перметрин.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Чистотел Максимум капли в 1 мл содержит в качестве действующих веществ: фипронил - 47,5 мг, перметрин - 9,5 мг, а в качестве вспомогательных веществ: диэтиленгликоля моноэтиловый эфир, полиэтиленгликоль 400, эфирное масло лаванды и спирт изопропиловый.
3. Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость светло-желтого цвета.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства. Хранить препарат после вскрытия флакона-капельницы в течение 9 месяцев. Чистотел Максимум капли по истечении срока годности не должны применяться.
4. Выпускают Чистотел Максимум капли расфасованными в полимерные тубик-пипетки по 0,5 и 1,0 мл в количестве 3, 4 штук и полимерные флаконы-капельницы по 5,0 мл поштучно, которые упаковывают в пачки из картона вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят Чистотел Максимум капли в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С при относительной влажности не более 60%.
6. Чистотел Максимум капли следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Чистотел Максимум капли относятся к группе комбинированных инсектоакарицидных лекарственных средств.

10. Фипронил и перметрин, входящие в состав препарата, оказывают контактное инсектоакарицидное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*), саркоптоидных и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия фипронила заключается в нарушении прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых рецепторах эктопаразита, нарушении передачи нервных импульсов и деятельности нервной системы, что приводит к параличу и гибели членистоногих.

Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

Чистотел Максимум капли по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладают местно-раздражающим и кожно-резорбтивным действием.

III. Порядок применения

11. Чистотел Максимум капли применяют собакам и кошкам, а также щенкам и котятм старше 3-месячного возраста при энтомозах (блохи, вши, власоеды), отодектозе, саркоптозе, нотоэдрозе, поражении иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

12. Чистотел Максимум капли запрещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

13. При работе с Чистотел Максимум каплями следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Не следует мыть, гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 48 часов после обработки препаратом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Чистотел Максимум каплями. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Чистотел Максимум капли запрещается применять кормящим и беременным самкам, щенкам и котятм моложе 3-месячного возраста.

15. Препарат применяют животным путем капельного нанесения на сухую неповрежденную кожу (16 капель соответствует объему 0,5 мл). Раздвинув шерсть, препарат наносят на кожу животному в места, недоступные

для слизывания – в области шеи у основания черепа или между лопатками в дозах, указанных в таблице.

Масса животного	Доза препарата, мл
Менее 2 кг	0,5
от 2 до 10 кг	1,0
от 10 до 20 кг	2,0
от 20 до 30 кг	3,0
от 30 до 40 кг	4,0
от 40 до 50 кг	5,0

При обработке крупных собак массой более 50 кг Чистотел Максимум капли дозируют из расчета 0,1 мл/кг, нанося на кожу в 3 – 4 места.

Продолжительность защитного действия от иксодовых клещей после однократной обработки сохраняется в течение 30 дней, против насекомых – до 2-х месяцев.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще 1-го раза в месяц.

При отодектозе (ушной чесотке) в предварительно очищенные ушные раковины закапывают по 1-3 капли препарата. Через каждые 3 – 5 дней процедуру повторяют до выздоровления.

С лечебной целью при саркоптозе собак и нотоэдрозе кошек препарат применяют 2-4-кратно, с интервалом 7-10 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований; в целях профилактики возможной инвазии – 1 раз в месяц. Лечение рекомендуется проводить комплексно, с применением этиотропных, патогенетических и симптоматических лекарственных средств.

При нападении иксодовых клещей следует нанести препарат в количестве 1-й капли непосредственно на клеща. Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из кожи пинцетом и уничтожают.

В целях предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют или обрабатывают подстилки инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по применению.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Чистотел Максимум капель в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и при необходимости животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

18. Не следует одновременно применять другие инсектоакарицидные препараты.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

21. Чистотел Максимум капли не предназначены для применения продуктивным животным.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Чистотел Максимум капель, утвержденная Россельхознадзором 23.01.2017 года.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23.
---	--

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.
---	--

Генеральный директор
АО «НПФ «Экопром»



В.В. Шаталов