

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Алюмиспрея для обработки ран у животных
(Организация-разработчик: ООО Фирма «БиоХимФарм», 600910,
Владимирская область, г. Радужный, квартал 16, а/я 74)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Алюмиспрей (Alumispreum).

Международное непатентованное название: алюминия окись (алюминиевая пудра).

2. Лекарственная форма: суспензия для наружного применения.

Алюмиспрей содержит в 100 мл в качестве действующего вещества алюминиевую пудру (алюминия окись) – 9,6 г и вспомогательные вещества — канифоль сосновую, клей БФ-6 и спирт этиловый.

3. По внешнему виду препарат представляет собой непрозрачную суспензию серого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать Алюмиспрей после окончания его срока годности.

4. Выпускают Алюмиспрей расфасованным по 100 мл, 170 мл и 350 мл в аэрозольные баллоны, по 30 мл, 50 мл и 100 мл в беспробеллентные флаконы с распылительными головками и защитными колпачками. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя вдали от нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5⁰ С до 25⁰ С.

6. Алюмиспрей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: препараты для лечения заболеваний кожи.

10. Алюминиевая пудра (алюминия окись) в составе Алюмиспрея оказывает адсорбирующее и подсушивающее действие, таким образом способствует ускорению заживления поврежденной ткани.

По степени воздействия на организм Алюмиспрей согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает кожно — раздражающего и резорбтивно — токсического действия.

III. Порядок применения

11. Алюмиспрей применяют для обработки ран у животных.

12. Противопоказанием для применения препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не использовать препарат для обработки ран сосков вымени у животных в период лактации и кормления молодняка в период новорожденности.

13. Лекарственный препарат применяют наружно местно. Перед нанесением препарата необходимо провести санитарную обработку раневой поверхности, в случае сильного кровотечения — его остановку.

Тщательно встряхнуть аэрозольный баллон (бес пропеллентный флакон) и наносить препарат, держа баллон (флакон) вертикально на расстоянии 15-20 см от раны. Количество используемого препарата зависит от размера и состояния раневой поверхности. Завершить нанесение препарата, когда образуется его равномерный слой и обрабатываемый участок приобретет характерный серый цвет. Применять препарат 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней.

14. Симптомов передозировки у животных не выявлено.

15. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не установлено.

16. Применение Алюмиспрея не оказывает влияния на течение беременности и развитие потомства у животных. Не использовать препарат для обработки ран сосков вымени у животных в период лактации и кормления молодняка в период новорожденности.

17. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее и далее продолжать обработки с рекомендуемым интервалом.

18. При применении Алюмиспрея в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

19. Алюмиспрей не следует назначать одновременно с другими лекарственными препаратами местного применения.

20. Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения Алюмиспрея можно использовать без ограничения. В случае вынужденного убоя животного обработанные Алюмиспреем участки туши зачищают и утилизируют.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. При работе с Алюмиспреем запрещается пить, курить и принимать пищу. Следует избегать попадания препарата на одежду и на открытые участки кожи, так как аэрозоль обладает красящими свойствами. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом. Пустые баллоны или флаконы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, немедленно промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).