



## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению Фронтлайн Спот Он

(организация-разработчик: Берингер Ингельхайм Анимал Хэлс Франс ЭсСиЭс, 29  
авеню Тони Гарнье, 69007, Лион, Франция / Boehringer Ingelheim Animal Health France  
SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007, Lyon, France)

№РУ 250-3-2.14-1955 НПВИ-3-0.3/01384

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Фронтлайн Спот Он (Frontline Spot On).

Международное непатентованное наименование: фипронил.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Фронтлайн Спот Он в качестве действующего вещества содержит фипронил – 10%, а в качестве вспомогательных веществ: этанол, повидон, полисорбат 80, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, и моноэтиловый эфир диэтиленгликоля.

3. По внешнему виду Фронтлайн Спот Он представляет собой прозрачный раствор от желтого до коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. После вскрытия пипетки препарат не подлежит хранению. Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают Фронтлайн Спот Он расфасованным по 0,5; 0,67; 1,34; 2,68 и 4,02 мл в пипетки из термоформованной оболочки (полипропилен и кополимер полиакрилонитрил-метилакрилата) и пленки (полиэтилентерефталат, алюминий и кополимер полиакрилонитрил-метилакрилата) с отламывающимся кончиком, помещенные поштучно в блистеры вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре не выше 30°C.

6. Фронтлайн Спот Он следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Фронтлайн Спот Он отпускается без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Фронтлайн Спот Он – инсектоакарицидный лекарственный препарат контактного действия.

10. Фипронил – инсектоакарицид группы фенилпиразолов, механизм его контактного действия заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

Фронтлайн Спот Он активен в отношении:

- половозрелых блох *Ctenocephalides spp.*;
- власоедов *Trichodectes canis, Felicola subrostratus*;
- иксодовых клещей (все фазы развития) *Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor*

- variabilis*, *Amblyomma americanum*, *Ixodes holocyclus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis spp.* включая *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis campanulata*, *Haemaphysalis leachi*;
- вшей *Linognathus setosus*;
  - чесоточных клещей *Sarcoptes scabiei var. canis*;
  - комаров *Aedes aegypti*.

После нанесения препарата на кожу фипронил в течение 24 часов постепенно распределяется по всей поверхности тела и, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывает длительное контактное действие (до 56-60 суток), метаболизируется с образованием активных в отношении эктопаразитов производных (в основном сульфонов).

Однократная обработка животного обеспечивает уничтожение блох и клещей в течение 24 - 48 часов. После обработки кошек защитное действие против клещей продолжается до 4 недель, против насекомых – 4-6 недель. После обработки собак защитное действие против клещей продолжается до 5 недель, против насекомых – 4-12 недель.

Фронтлайн Спот Он по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, не обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

### III. Порядок применения

11. Фронтлайн Спот Он назначают собакам и кошкам, в том числе беременным и лактирующим животным, при энтомозах, отодектозе, поражении клещами, а также в комплексной терапии аллергического дерматита, вызываемого блохами.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

Запрещается применение Фронтлайна Спот Он больным инфекционными болезнями, выздоравливающим и ослабленным животным, щенкам и котятам моложе 8-недельного возраста, собакам массой менее 2 кг, кошкам массой менее 1 кг.

Не допускается при прободении барабанной перепонки аурикулярное применение препарата в процессе лечения отодектоза.

Не следует допускать попадание препарата на слизистую оболочку глаз животных, а также наносить препарат на влажную или поврежденную кожу.

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Фронтлайн Спот Он рекомендуется использовать резиновые перчатки. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Не следует гладить и допускать контакта детей с обработанными животными, допускать животных в постель к людям до полного высыхания места нанесения препарата (в течение 24 часов после обработки), допускать к работе с препаратом лиц с признаками аллергических, респираторных и кожных заболеваний. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата необходимо избегать прямого контакта с Фронтлайн Спот Он. При случайном попадании лекарственного препарата

на кожу или слизистые оболочки глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Запрещается использование пустых пипеток из-под лекарственного препарата для бытовых целей; их помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

14. Фронтлайн Спот Он можно использовать для обработки племенных животных, беременных и лактирующих самок.

15. Фронтлайн Спот Он применяют животным путем однократного топикального нанесения на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки различной фасовки.

Перед обработкой извлекают пипетку из блистера, легким постукиванием стряхивают препарат в расширенную часть пипетки, по линии насечки отламывают кончик пипетки. Раздвигают у животного шерсть у основания шеи между лопатками (в области холки) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в одно место в минимальной дозе 0,067 мл/кг для собак и 0,05 мл/кг для кошек, согласно таблице. При обработке собак массой более 60 кг используют комбинацию пипеток разного объема.

Для обработки кошек, масса которых более 10 кг, используют 2 пипетки объемом 0,5 мл.

Вид животного, масса (кг)	Объем используемой пипетки и обозначение на упаковке	Содержание фипронила (мг)
Кошки	0,5	50
Собаки:		
2-10	0,67 мл (S)	67
10-20	1,34 мл (M)	134
20-40	2,68 мл (L)	268
40-60	4,02 мл (XL)	402

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в 4 недели.

В целях предотвращения повторной инфestationи животных блохами рекомендуется обрабатывать всех кошек и собак, обитающих совместно, а также заменить подстилки или обработать их инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению.

Для лечения отодектоза Фронтлайн Спот Он закапывают однократно в каждое ухо по 4-6 капель (капли обязательно вводят в оба уха). Для равномерного распределения препарата ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание. Остаток препарата в используемой пипетке (в расчете на массу животного), наносят на кожу между лопаток. При осложнении отодектоза отитом назначают противомикробные и противовоспалительные средства.

Не следует мыть и купать животных, допускать их в природные водоемы в течение 48 часов после обработки.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. Очень редко на месте нанесения препарата возможно склеивание шерсти, слабо выраженная реакция кожи (обесцвечивание кожи, зуд, выпадение шерсти, покраснение кожи),

общий зуд или алопеция, при попадании препарата внутрь - чрезмерное слюноотделение. В исключительных случаях может наблюдаться чрезмерное слюноотделение, обратимые неврологические симптомы (гиперстезия, угнетение, неврологические признаки), рвота или респираторные симптомы. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций препарат следует смыть водой с моющим средством и при необходимости назначить антигистаминные препараты.

17. При значительной передозировке у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота, нарушение со стороны дыхательной системы, гиперстезия. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством, животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

18. Фронтлайн Спот Он не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными препаратами для обработки животных.

19. Особенностью действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено. На шерсти животного может отмечаться влажное или масляное пятно на протяжении 24 часов после нанесения препарата.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

21. Фронтлайн Спот Он не предназначен для обработки продуктивных животных.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

Берингер Ингельхайм Анимал Хэлс  
Франс, 4 Шеми дю Кальке, 31000 Тулуза,  
Франция /  
Boehringer Ingelheim Animal Health France,  
4 chemin du Calquet, 31000, Toulouse,  
France

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя/Импортер

ООО «Берингер Ингельхайм»,  
Российская Федерация,  
125171, Москва, Ленинградское шоссе,  
16А, стр.3  
Тел.: +7 495 544 50 44

Менеджер по регистрации  
подразделения ветеринарных препаратов  
ООО «Берингер Ингельхайм»



Полухина Ю.А.