

СОГЛАСОВАНО  
Россельхознадзором  
14 сентября 2017 г

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению препарата Гестренол<sup>®</sup> таблетки  
для регуляции половой охоты у кошек и котов

(организация-разработчик ООО «НПК «СКИФФ» 117312 г. Москва  
пр-т 60-летия Октября, д. 7, корп. 1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Гестренол<sup>®</sup> таблетки (Gestrenol tabulettae).

Международное непатентованное наименование действующих веществ лекарственного препарата: пропионат мепрегенола и этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Гестренол<sup>®</sup> таблетки выпускают в двух дозировках, содержащих в качестве действующих веществ в 1 таблетке массой 100 мг:

«для кошек» - пропионат мепрегенола – 0,1500 мг, этинилэстрадиол – 0,0015 мг.

«для котов» - пропионат мепрегенола – 0,40 мг, этинилэстрадиол – 0,02 мг.

В качестве вспомогательных веществ Гестренол<sup>®</sup> таблетки содержат: лактозу, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция стеарат.

3. По внешнему виду препарат представляет собой таблетки овальной формы, белого или белого с сероватым оттенком цвета с логотипом «Гл» с одной стороны.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

Лекарственный препарат запрещается применять по истечении срока годности.

4. Гестренол<sup>®</sup> таблетки выпускают расфасованными по 5 или 10 штук в блистере. 2 блистера по 5 таблеток или 1 блистер по 10 таблеток помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

5. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.

6. Гестренол<sup>®</sup> таблетки следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. Гестренол<sup>®</sup> таблетки - бигормональный контрацептивный лекарственный препарат, содержащий в качестве действующих веществ гормоны: гестаген – пропионат мепрегенола и эстроген – этинилэстрадиол.

Пропионат мепрегенола блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберины (фолликулостимулирующий и лютеинизирующий рилизинг гормоны), которые являются пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за развитие в яичниках фолликулов и их овуляцию у кошек, а у котов за снижение уровня тестостерона в крови, угнетение половых рефлексов и сперматогенез.

Этинилэстрадиол в комплексе с пропионатом мепрегенола усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды у кошек, вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

Пропионат мепрегенола и этинилэстрадиол после перорального применения быстро всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

Гестренол<sup>®</sup> таблетки по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

## III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат Гестренол<sup>®</sup> таблетки применяют для регуляции половой охоты:

- кошкам – для прерывания течки и поддержания успокаивающего эффекта (задержки течки), а также для предотвращения нежелательной беременности;
- котам – для прерывания полового возбуждения и устранения связанного с ним нежелательного поведения: агрессивности, повышенной возбудимости, мечения территории, а также для поддержания успокаивающего эффекта (предупреждения полового возбуждения).

12. Препарат противопоказан беременным и кормящим самкам, животным, не достигшим половой зрелости, при новообразованиях молочной железы, заболеваниях половых органов, при сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов препарата.

13. Гестренол<sup>®</sup> таблетки применяют перорально, индивидуально с кормом или вводят принудительно на корень языка, используя дозировку препарата, соответствующую полу животного («для кошек» или «для котов»).

Для прерывания течки у кошек и полового возбуждения у котов применение лекарственного препарата начинают при первых признаках начала половой охоты 1 раз в сутки в следующих дозах: животным массой до 5 кг – 1 таблетка,

животным массой свыше 5 кг – 2 таблетки в течение 3-5 дней (до полного прекращения половой охоты). Применение препарата неэффективно, если с момента начала половой охоты прошло более 2-х дней. Повторный курс проводится по необходимости.

Молодым котам в первый день Гестренол® таблетки назначают в разовой дозе 2 таблетки на животное.

В случае быстрого успокоения животного (за 2-3 дня) для закрепления эффекта применение лекарственного препарата продолжают еще один день.

Молодым кошкам в первую течку применение Гестренол® таблеток не рекомендуется, в связи с трудностью выявления начала половой охоты.

Для поддержания успокаивающего эффекта (задержки течки у кошек и предупреждения полового возбуждения у котов) препарат назначают кошкам и котам регулярно по 1 таблетке 1 раз в неделю. Начинать применение лекарственного препарата рекомендуется животным, находящимся в стадии покоя или через неделю после подавления половой охоты.

Полное восстановление репродуктивной функции у кошек и котов происходит через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата.

Для предупреждения нежелательной беременности после случайного спаривания Гестренол® таблетки назначают кошкам в первые 24 часа после спаривания в дозе 2 таблетки на животное и затем повторно через 24 часа.

14. Симптомы передозировки при применении Гестренол® таблеток не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или при отмене не установлено.

16. Запрещается применение Гестренол® таблеток самкам в период беременности и лактации, а также потомству до достижения половозрелого возраста.

17. Следует избегать пропусков очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае нарушения установленного срока повторного применения, препарат следует применить как можно быстрее, в той же дозе и по той же схеме. При нарушении интервала между применением препарата менее чем на 12 часов, его терапевтическая эффективность не снижается.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Гестренол® таблеток в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

19. Информация об особенностях взаимодействия Гестренол® таблеток с другими лекарственными препаратами отсутствует.

20. Гестренол® таблетки не предназначены для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При применении лекарственного препарата Гестренол<sup>®</sup> таблетки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время применения лекарственного препарата не разрешается пить, курить и принимать пищу, по окончании следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Гестренол<sup>®</sup> таблетками. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителей лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения.

1. ООО «НВП «Астрафарм», 117246,  
г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3.  
Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

2. ООО «НПК «СКИФФ», 117246,  
г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3.  
Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246,  
г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3  
Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Гестренол таблетки, утвержденная Россельхознадзором 21 ноября 2016 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-11.17-3882№ПВР-3-1.5/01395