



ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Инсектин шампунь инсектицидный

(организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл.,
г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-8.18-4192 №ПВР-3-5.6/01738

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Инсектин шампунь инсектицидный (Insectin shampoo insecticides);
международное непатентованное наименование: перметрин.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Инсектин шампунь инсектицидный в качестве действующего вещества содержит перметрин – 0,5%, а в качестве вспомогательных компонентов: лаурилсульфат натрия этоксилированный, диэтаноламид кокосового масла, кокамидопропилбетаин, кислоту лимонную, натрия хлорид, глицерет-2-кокоат, полуформаль бензилового спирта, гидрогенизированное касторовое масло, кокоамфодиацетатнатрия+натрийкокоамфоацетат амфотерный, поликватерниум 7, отдушку травяную, трилон Б и воду питьевую.

3. По внешнему виду препарат представляет собой однородную прозрачную бесцветную жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 400 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные пластмассовыми крышками.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °C до 30 °C.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Инсектин шампунь инсектицидный относится к лекарственным инсектицидным препаратам для наружного применения.

10. Входящий в состав препарата синтетический пиретроид перметрин (3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметил-циклопропанкарбоксилат) обладает выраженным контактным инсектицидным действием, активен в отношении имагинальных и личиночных фаз развития вшей, блох и власоедов, паразитирующих на собаках и кошках. Механизм его действия заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

Вспомогательные вещества препарата обладают моющими свойствами, увлажняют кожу, облегчают расчесывание, предотвращают спутывание шерсти, придают шерстному покрову шелковистость и блеск.

Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего, резорбтивно-токсического и сенсибилизирующего действия, вызывает слабое раздражение слизистых оболочек. Препарат токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Инсектин шампунь инсектицидный применяют для уничтожения возбудителей энтомозов (блох, вшей, власоедов), паразитирующих на собаках и кошках.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями, выздоравливающие животные.

13. При применении препарата следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Обработку животного следует проводить, используя резиновые перчатки. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки. Пустые флаконы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Не подлежат обработке беременные, кормящие самки, а также котята и щенки моложе 12-недельного возраста.

15. Перед обработкой кожно-волосяной покров животного обильно смачивают теплой водой, а затем наносят шампунь из расчета 0,5 - 1,0 мл на 1 кг массы животного, слегка втирают до образования пены, избегая попадания в глаза и предотвращая спутывание препарата животным. Через 5-7 минут шампунь тщательно смывают теплой водой, шерсть расчесывают гребнем и высушивают. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям, но не чаще одного раза в 14 дней.

Для предотвращения повторного заражения животных блохами подстилки заменяют или обрабатывают препаратом в разведении водой 1:2 с нормой расхода

10 мл/м² обрабатываемой поверхности. В течение трех дней не допускают контакта животного с подстилкой, а перед последующим использованием ее стирают с моющим средством.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Инсектин шампуня инсектицидного в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат тщательно смывают водой и при необходимости животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат тщательно смывают водой и животному назначают средства симптоматической терапии.

18. Препарат не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных.

19. Особеностей действия препарата при первом применении и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее возобновляют в той же дозе по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Инсектин шампуня инсектицидного, согласованная Россельхознадзором 16.07.2018 года.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263

Генеральный директор
АО «НПФ «Экопром»

В.В. Шаталов

