

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению ветеринарного препарата Капли глазные и интраназальные Анадин

(организация-разработчик: ООО «Научно-исследовательское общество «Медитэр»
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д.4 «А», литер «А»)

Номер регистрационного удостоверения: 78-3-7.12-0688 № ПВР-3-2.0/00339 от 24.04.2012 г

I. Общие сведения.

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли глазные и интраназальные Анадин.
- Международное непатентованное и химическое наименование: глюкаминопропилкарбакридон.
2. Лекарственная форма: капли глазные и интраназальные.
3. Лекарственный препарат капли глазные и интраназальные Анадин содержит в 1 мл раствора в качестве действующего вещества глюкаминопропилкарбакридон – 20 мг, а также вспомогательные компоненты вещества: глицерин и воду для инъекций.
4. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-зеленого цвета.
5. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. Запрещается применять Капли глазные и интраназальные Анадин по истечении срока годности.
6. Выпускают капли глазные и интраназальные Анадин расфасованными по 5 мл во флаконы из нейтрального стекла, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон упаковывают в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
7. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.
8. Капли глазные и интраназальные Анадин следует хранить в местах, недоступных для детей.
9. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
10. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Капли глазные и интраназальные Анадин относятся к фармакотерапевтической группе - иммуномодуляторы.
10. Глюкаминопропилкарбакридон (Анадин), входящий в состав капель, относится к низкомолекулярным индукторам цитокинов, обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием, стимулирует выработку эндогенного интерферона, повышает функциональную активность Т-лимфоцитов и макрофагов, активизирует продукцию провоспалительных цитокинов.
- Максимальная концентрация Анадина в крови наблюдается через час после введения. Накопления в организме не происходит, препарат полностью выводится через почки в неизменном виде. Капли глазные и интраназальные Анадин по степени воздействия на

организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Лекарственный препарат не обладает местно-раздражающим, резорбтивно-токсическим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения.

11. Капли глазные и интраназальные Анадин применяют в комплексной терапии конъюнктивитов и ринитов различной этиологии у собак и кошек.
12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата служит повышенная индивидуальная чувствительность животного к входящим в состав препарата компонентам.
13. При работе с каплями глазными и интраназальными Анадин следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.
14. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с каплями глазными и интраназальными Анадин. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.
15. Специальные исследования на беременных и лактирующих животных не проводились. Возможность применения капель глазных и интраназальных Анадин самкам в период беременности и вскармливания приплода определяет лечащий врач на основании оценки отношения пользы к возможному риску применения препарата.
16. При конъюнктивитах препарат закапывают по 2-3 капли за нижнее веко два раза в день, при ринитах – по 2-4 капли в каждый носовой ход два-три раза в день. Лечение проводят до выздоровления животного, но не более 14 дней. Во время лечения препаратом не требуется специальных условий содержания и кормления животных.
17. Побочных явлений и осложнений при применении капель глазных и интраназальных Анадин в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата и появлении признаков выраженного раздражения применение лекарственного средства прекращают и при необходимости назначают антигистаминные средства.
18. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.
19. Капли глазные и интраназальные Анадин совместимы с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками.
20. Особенности действия при начале приема препарата и при его отмене не установлены.
21. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической активности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.
22. Капли глазные и интраназальные Анадин не предназначены для применения продуктивным животным.



Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Научно-исследовательское общество «Медитэр», 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского д. 9, лит. А.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Научно-исследовательское общество «Медитэр», 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского д. 9, лит. А.
Тел. +7 812 4666632, e-mail: mediter@peterlink.ru