

# ГЕПАСЕЙФ®

раствор для инъекций

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению препарата Гепасейф® при заболеваниях печени различной этиологии  
у собак и кошек

Согласовано заместителем Руководителя Россельхознадзора Власовым Н.А.  
(Организация-разработчик ООО «НВЦ Агротехзащита», г. Москва)

## I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Гепасейф® (Gepaseyf).

Международные непатентованные наименования: силибинин и токоферол.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Гепасейф® в 1 мл в качестве действующего вещества содержит силимарин – 12 мг, витамин Е – 2 мг, а в качестве вспомогательных веществ: 1-метил-2-пирролидон, кремофор, бензиловый спирт и воду для инъекции.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, при хранении допускается наличие осадка, исчезающего при встряхивании. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год со дня производства. После первого вскрытия флакона препарат следует хранить не более 10 суток при температуре от 2 °С до 10 °С. Запрещается применение Гепасейфа по истечении срока годности.

Выпускают препарат расфасованным по 5; 10; 20; 50; 100 и 200 мл во флаконы из темного стекла, которые индивидуально упаковывают в картонные пачки. Флаконы по 100 мл и 200 мл могут выпускаться без вторичной упаковки. Флаконы укупоривают резиновыми пробками и обкатывают алюминиевыми колпачками. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.

Гепасейф® следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

Гепасейф® относится к гепатотропным лекарственным препаратам.

Гепатопротективное действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов.

В состав препарата входит комплекс изомерных флавоноидных соединений – флаволигнанов силибинина, силикристина, силидианина, изосилибинина и дегидросилибинина, выделяемых из лекарственного растения расторопши пятнистой (*Silybum marianum* (L.)), а также эссенциальные фосфолипиды и витамины.

Флаволигнаны из расторопши пятнистой являются сильными антиоксидантами и способны инактивировать как свободные радикалы, так и активные формы кислорода в клетке, блокировать рецепторы и транспортные системы на клеточной мембране, которые обеспечивают перенос токсических веществ в клетку, уменьшать активность макрофагальных клеток, участвующих в презентации антигенов, снижать продукцию гамма-глобулинов, блокировать липооксигеназы и циклооксигеназы, тем самым оказывая противовоспалительное, иммуномодулирующее и антиканцерогенное действие. Наряду с этим флавоноиды расторопши, взаимодействуя с мембранами гепатоцитов, способны ингибировать активность цАМФ и кальций-зависимого процесса активации фосфолипаз, оказывают цитопротективный эффект на гепатоциты. Кроме того силимарин стимулирует синтез белка и регенерацию клеток печени (гепатоцитов) из-за частичного структурного сходства со стероидными гормонами, тем самым оказывая регенеративный эффект. Витамин Е является главным представителем группы антиоксидантов, замедляя старение клеток, вызванное пагубным воздействием свободных радикалов, проявляет антигипоксантную функцию.

По степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в терапевтических дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного, канцерогенного и сенсibiliзирующего действия.

### III. Порядок применения

**Гепасейф® применяют собакам и кошкам в комплексной терапии и профилактике острых и хронических заболеваний печени различной этиологии, в том числе инфекционных, инвазионных заболеваний и токсических повреждений, для снижения побочных эффектов при назначении гепатопротективных химиотерапевтических средств, при дистрофии и жировой инфильтрации печени, нарушениях липидного обмена.**

Противопоказанием к применению Гепасейфа является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

**Препарат применяют собакам и кошкам внутримышечно в дозе 0,1 мл на 1 кг массы животного (1,2 мг силимарина и 0,2 мг витамина Е на 1 кг массы) один раз в сутки. Продолжительность курса лечения 7-14 дней в зависимости от течения патологического процесса.**

**В профилактических целях препарат вводят в дозе 0,1 мл на 1 кг массы животного однократно.**

**Перед применением раствор во флаконе следует тщательно взболтать. Забор каждой дозы препарата из многодозового флакона производят в асептических условиях с использованием стерильного шприца со стерильной иглой.**

Симптомы передозировки лекарственного препарата не выявлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Беременным и лактирующим животным, щенкам и котятм Гепасейф® следует применять с осторожностью под контролем ветеринарного врача.

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. При пропуске очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

Побочных явлений и осложнений при применении Гепасейфа в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и проявлениях аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Гепасейф® совместим с лекарственными препаратами, кормами и кормовыми добавками.

Гепасейф® не предназначен для применения продуктивным животным.

### IV. Меры личной профилактики

При работе с препаратом Гепасейф® необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз немедленно промойте их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Гепасейфом. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Номер регистрационного удостоверения 77-3-8.18-4207№ПВР-3-21.13/02941

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Гепасейфа, утвержденная Россельхознадзором 11.09.2013 года.



Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: ООО «АВЗ С-П», 141305, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.  
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «АВЗ С-П», 141305, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.  
Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).  
Информация о подтверждении соответствия продукта размещена на сайте [www.vetmag.ru](http://www.vetmag.ru)