

ГЕПАСЕЙФ ПЛЮС

НАСТАВЛЕНИЕ
по применению Гепасейфа плюс для лечения и профилактики заболеваний печени у собак и кошек
(организация-разработчик: ТОО «ВетЗащитаАзия», г. Костанай)

УТВЕРЖДЕНО
И.о. председателя Комитета Ветеринарного Контроля и Надзора МСХ РК Кабдулдановым Т.А.

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Гепасейф плюс (Gepasafe plus).

Международные непатентованные наименования: силибинин, токоферол, метионин.

Лекарственная форма: суспензия для орального применения.

Гепасейф плюс в качестве действующих веществ в 1 мл содержит силимарин - 40 мг, витамин Е – 5 мг, метионин – 4 мг и вспомогательные вещества: лактулозу – 20 мг и воду очищенную до 1 мл. По внешнему виду Гепасейф плюс представляет собой суспензию, коричневого цвета со специфическим запахом. Допускается образование осадка при хранении.

Лекарственный препарат выпускают расфасованным в стеклянные флаконы 50, 100, 200, 250 мл; в полимерные флаконы по 50, 100, 200 и 250 мл; в полимерные бутылки по 500 и 1000 мл. Флаконы с препаратом индивидуально упаковывают вместе с инструкцией по применению в картонные пачки. В каждую пачку возможно вложение мерного стаканчика и (или) одноразового шприца. Допускается упаковка флаконов без помещения в картонную пачку.

Гепасейф плюс хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. После первого вскрытия лекарственный препарат можно использовать в течение 30 суток.

Гепасейф плюс запрещается применять по истечении срока годности.

Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Гепасейф плюс относится к гепатопротекторным препаратам. Входящие в состав препарата Гепасейф плюс действующие вещества улучшают функциональное состояние печени, способствуют защите и восстановлению структуры гепатоцитов; нормализуют уровень аммиака и ускоряют регенерацию клеток печени.

Силимарин оказывает регенерирующее, гепатопротекторное, дезинтоксикационное действие, защищает ткани печени при различных токсических поражениях, способствует восстановлению функции и структуры клеток печени.

Витамин Е тормозит развитие свободнорадикальных реакций, предупреждает образование перекисей, повреждающих клеточные и субклеточные мембраны.

Метионин представляет собой незаменимую для организма аминокислоту. Обладает гепатопротекторным действием. Активирует действие гормонов, витаминов и ферментов. Снижает концентрацию холестерина в крови и увеличивает содержание фосфолипидов.

Гепасейф плюс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

Гепасейф плюс назначают собакам и кошкам самостоятельно или в составе комплексной терапии для лечения и профилактики острых

и хронических заболеваний печени различной этиологии (гепатиты, цирроз печени, дистрофия и жировая дегенерация печени, коррекция нарушений липидного обмена), в том числе инфекционных, инвазионных заболеваний, а также для снижения гепатотоксического действия химиотерапевтических лекарственных средств.

Запрещается применение лекарственного препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

Препарат применяют перорально, индивидуальным способом с помощью шприца-дозатора 2 раза в день в течение 3 недель, в дозах указанных в таблице:

Масса животного	Разовая доза, мл	Суточная доза, мл
Кошки		
до 3 кг	1	2
3 – 6 кг	2	4
от 7 и более	3	6
Собаки		
до 10 кг	2	4
10 – 20 кг	3	6
20 – 30 кг	4	8
30 – 40 кг	5	10
от 40 и более	6	12

При необходимости курс лечения повторяют через 2 – 3 недели. Перед применением суспензию рекомендуется взболтать.

Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не установлены.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы лекарственного препарата курс применения необ-

ходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

Побочных явлений и осложнений у собак и кошек при применении Гепасейфа плюс в соответствии с настоящей инструкцией не установлено. В редких случаях (у кошек), после применения лекарственного препарата, может наблюдаться гиперсаливация. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.

Гепасейф плюс совместим с лекарственными средствами, кормами и кормовыми добавками. Гепасейф плюс не предназначен для применения продуктивным животным


IV. Меры личной профилактики

При работе с Гепасейф плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Гепасейф плюс. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-4923-23



Наставление по применению разработано ТОО «ВетЗащитаАзия», г. Костанай