

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

21 ДЕК 2023

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
ИН-АП спрей

(Организация-разработчик: ООО «БиоФерон»; 119234, г. Москва,
ул. Ленинские горы, дом 1, строение 77, этаж 1, комната 101А)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-27.23-5007N/ПВР-3-27.23/03882

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: ИН-АП спрей (ИН-АП spray).

международное непатентованное наименование действующих веществ:
фипронил, S-метопрен.

2. Лекарственная форма: спрей для наружного применения.

ИН-АП спрей в 1 мл в качестве действующих веществ содержит фипронил - 2,5 мг и S-метопрен - 2,2 мг, а также вспомогательные вещества: повидон, отдушку, изопропиловый спирт и воду очищенную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную, бесцветную или светло-жёлтого цвета жидкость, со слабым ароматическим запахом.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают ИН-АП спрей расфасованным по 100 мл «для кошек и собак мелких пород» и по 150 мл «для собак средних и крупных пород» во флаконы полимерные, укупоренные пластмассовыми насосами-распылителями курковыми. Каждый флакон с препаратом снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, вдали от нагревательных приборов и источников огня, при температуре не выше 25°C. Во время транспортировки допускается кратковременное замораживание лекарственного препарата, который не теряет своих характеристик после оттаивания.

6. ИН-АП спрей следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта.

II. Фармакологические свойства

9. ИН-АП спрей относится к комбинированным инсектоакарицидным лекарственным препаратам.

10. Комбинация фипронила и S-метопрена, входящих в состав препарата, обеспечивает широкий спектр его контактного инсектоакарицидного действия в отношении блох (*Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setosus*) и власоедов (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) и иксодовых (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp.) клещей, паразитирующих у собак и кошек.

Фипронил - инсектоакарицид группы фенилпиразолов, механизм его контактного действия заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

S-метопрен - аналог природных ювенильных гормонов, вызывает аномалии развития на стадии яйца и личинки, предотвращая появление половозрелых насекомых в местах содержания животных.

После нанесения препарата на кожу его активные компоненты равномерно распределяются по поверхности тела, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах животного, оказывая длительное контактное инсектоакарицидное действие, а также предотвращают развитие эктопаразитов на животных и в местах их содержания.

Однократная обработка животного обеспечивает уничтожение блох в течение 24 часов, вшей и власоедов – в течение 48 часов.

Защитное действие препарата в зависимости от условий окружающей среды после однократной обработки собак против иксодовых клещей продолжается до 4-х недель, против блох, вшей и власоедов до 10-ти недель, у кошек против блох и власоедов до 8-ми недель.

ИН-АП спрей по степени воздействия на организм относится к мало опасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 при накожном нанесении), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического, эмбриотропного и тератогенного действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, пчёл, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. ИН-АП спрей применяют собакам и кошкам для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых блохами, вшами, власоедами, поражения иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

Препарат не следует применять больным инфекционными болезнями, выздоравливающим и ослабленным животным.

13. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием ИН-АП спрея рекомендуется использовать одноразовые резиновые перчатки. По окончании работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки водой с мылом. Не следует проводить обработку в присутствии маленьких детей.

В течение 24 часов после обработки или до полного высыхания шерсти не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям.

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Препарат не следует наносить на влажную кожу. До полного высыхания шерстного покрова, после обработки, не следует позволять животным слизывать препарат, допускать их к открытому огню и нагревательным приборам. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата необходимо избегать прямого контакта с ним. При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом; при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае проявления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Беременным и лактирующим сукам и кошкам препарат применяют при необходимости под контролем ветеринарного врача.

Запрещается применять лекарственный препарат щенкам и котятм моложе 2-х месячного возраста.

15. Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках), предварительно удалив из помещения клетки с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами. Для предотвращения слизывания препарата животному надевают намордник или шейный воротник, которые снимают после полного высыхания шерстного покрова.

Не рекомендуется мыть животное за 2 дня до обработки, а также мыть и купать в открытых водоёмах в течение 2-х дней после обработки ИН-АП спреем.

Перед использованием флакон с препаратом тщательно встряхивают и, держа его вертикально, нажимают на курок распылителя, направляя распылитель на обрабатываемую поверхность с расстояния 10-20 см.

Для уничтожения иксодовых клещей, прикрепленных на теле животного, препарат в дозе 1,0-2,0 мл (1-2 нажатия на курок) наносят на клеща и прилегающий участок кожи. Если в течение 10-15 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно извлекают пинцетом и уничтожают.

Доза препарата для предотвращения нападения эктопаразитов в зависимости от длины шерсти составляет 3,0-6,0 мл (3-6 нажатий на курок) на 1 кг массы тела животного; одно нажатие на распылитель обеспечивает дозу препарата 1,0 мл.

Доза препарата для уничтожения блох, вшей и власоедов на животном составляет 6 мл (6 нажатий на курок) на 1 кг массы тела.

Для уничтожения и предотвращения нападения эктопаразитов ИН-АП спреем обрабатывают всё туловище животного, одной рукой, раздвинув шерсть против её роста (у животных длинношерстных пород шерсть приподнимают рукой), другой распыляя спрей на кожу. Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные раковины и грудь, кончиками пальцев (в перчатке) препарат слегка втирают вокруг глаз и носа. Затем рукой в перчатке втирают спрей по всему шерстному покрову с помощью поглаживающих движений.

В целях предотвращения повторной инфекации животных блохами рекомендуется обрабатывать всех кошек и собак, обитающих совместно, а также обработать места их содержания ИН-АП спреем.

Повторные профилактические обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в 2 недели.

Для уничтожения блох в местах содержания и предотвращения повторной инфекации, будки, клетки, плинтусы, щели в полу, подстилки, лежаки, попоны и другие предметы ухода за животными обрабатывают ИН-АП спреем из расчёта не менее 18,0 мл (18 нажатий на курок) на 1 м² обрабатываемой поверхности. Через 1-2 часа помещение проветривают в течение 60-ти минут, а затем обработанные поверхности очищают пылесосом.

Повторные обработки мест содержания и предметов ухода за животными, при необходимости, проводят не чаще 1 раза в 4 недели.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При слизывании препарата с шерсти у животного возможно повышенное слюноотделение, рвота.

В редких случаях возможно проявление таких проходящих реакций, как покраснение кожи, зуд. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении нежелательных реакций и осложнений препарат смывают водой с моющим средством и, при необходимости, проводят десенсибилизирующую терапию.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством, животному назначают средства симптоматической терапии.

18. ИН-АП спрей не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными средствами.

19. Особенности действия при первом применении ИН-АП спрея и при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки её возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

21. ИН-АП спрей не предназначен для обработки продуктивных животных.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «НВП «Астрафарм»: 117246,
г. Москва, Научный проезд, дом 20,
стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм»: 117246,
г. Москва, Научный проезд, дом 20,
стр. 3, помещение I, комната 35.
Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Директор ООО «БиоФерон»



Е. В. Дьякова