

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

14 ДЕК 2023

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата ФОРСЕКТО®

(Организация-разработчик: ООО «БиоФерон»; 119234, г. Москва,
ул. Ленинские горы, дом 1, строение 77, этаж 1, комната 101А)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-27.23-5863 / ПВР-3-27.23/03878

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: ФОРСЕКТО® (Forsecto®);

международное непатентованное наименование действующих веществ: тебуфенпирад, этофенпрокс.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Лекарственный препарат выпускают в двух дозировках, содержащих в качестве действующих веществ в 1 мл:

- «ФОРСЕКТО® для кошек от 2 до 4 кг», «ФОРСЕКТО® для кошек от 4 до 6 кг»: тебуфенпирад – 66,7 мг/мл, этофенпрокс – 100 мг/мл;

- «ФОРСЕКТО® для собак и щенков от 2,5 до 5 кг», «ФОРСЕКТО® для собак и щенков от 5 до 10 кг», «ФОРСЕКТО® для собак и щенков от 10 до 20 кг», «ФОРСЕКТО® для собак и щенков от 20 до 30 кг», «ФОРСЕКТО® для собак от 30 до 40 кг»: тебуфенпирад – 150 мг/мл, этофенпрокс – 300 мг/мл.

В качестве вспомогательных веществ лекарственный препарат содержит: повидон, отдушку, бензиловый спирт, моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, бутилгидрокситолуол, бутилгидроксианизол.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость от светло-жёлтого до жёлтого с коричневатым оттенком цвета, со слабым травянистым запахом.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства.

ФОРСЕКТО® запрещается применять по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по:

- 0,6 мл «ФОРСЕКТО® для кошек от 2 до 4 кг»;
- 0,9 мл «ФОРСЕКТО® для кошек от 4 до 6 кг»;
- 0,5 мл «ФОРСЕКТО® для собак и щенков от 2,5 до 5 кг»;
- 1,0 мл «ФОРСЕКТО® для собак и щенков от 5 до 10 кг»;

- 2,0 мл «ФОРСЕКТО® для собак и щенков от 10 до 20 кг»;
- 3,0 мл «ФОРСЕКТО® для собак и щенков от 20 до 30 кг»;
- 4,0 мл «ФОРСЕКТО® для собак от 30 до 40 кг»

в пипетки из комбинированных материалов, которые упаковывают по 2 штуки в блистер, снабженный вкладышем и помещают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре не выше 25°C.

6. ФОРСЕКТО® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта.

II. Фармакологические свойства

9. Лекарственный препарат ФОРСЕКТО® относится к фармакотерапевтической группе инсектоакарицидные средства в комбинациях.

10. Лекарственный препарат ФОРСЕКТО® обладает выраженной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз развития блох *Ctenocephalides spp.*, вшей *Linognathus setosus*, власоедов *Trichodectes canis* и *Felicola subrostratus*, иксодовых клещей *Rhipicephalus sanguineus* и *Dermacentor reticulatus*, комаров *Aedes albopictus*, *Aedes caspius*, *Culex pipiens* и *Culex modestus*, паразитирующих на собаках и кошках.

Тебуфенпирад – инсектоакарицид контактного и кишечного действия из группы пиразолкарбоксимидов, активен в отношении вшей, блох, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках. Механизм его действия заключается в ингибировании митохондриального окислительного фосфорилирования и нарушении транспорта электронов в митохондриях эктопаразитов, что вызывает дефицит АТФ и приводит к гибели клеток.

Этофенпрокс - соединение из группы пиретроидных эфиров, обладает контактным и кишечным действием, нарушает нормальную функцию натриевых каналов членистоногих, блокирует прохождение нервных импульсов по аксонам, что приводит к перевозбуждению нервной системы, параличу и гибели эктопаразитов. Обладает инсектоакарицидной и репеллентной активностью. В отношении иксодовых клещей оказывает нокдаун-эффект: вызывает их частичный или полный паралич, делая невозможным прикрепление к животному.

После топикального нанесения на кожу активные компоненты препарата постепенно распределяются по поверхности тела, не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в липидном слое, покрывающем эпидермис, и оказывают длительное контактное инсектоакарицидное действие, обеспечивая защиту животного от эктопаразитов.

После топикального нанесения лекарственного препарата ФОРСЕКТО® гибель паразитирующих на животном блох и иксодовых

клещей происходит в течение 24 часов после обработки. Гибель вшей и власоедов наступает в течение 7 суток.

Против иксодовых клещей защитное действие препарата продолжается у кошек в течение 5 недель, у щенков и собак в течение 6 недель.

В период длительной защиты после обработки животного лекарственный препарат ФОРСЕКТО® в отношении иксодовых клещей также обладает выраженным нокдаун-эффектом. После контакта с шерстью обработанного препаратом животного у иксодовых клещей в течение трех-пяти минут наступает паралич, из-за чего они теряют способность прикрепляться к коже животного.

Против блох, вшей и власоедов защитное действие препарата продолжается у кошек в течение 7 недель, у щенков и собак в течение 8 недель. Гибель насекомых происходит до откладки яиц, что профилактирует контаминацию мест содержания и окружающей животных среды яйцами и личинками данных эктопаразитов.

Против комаров репеллентное действие препарата продолжается до 10 дней после обработки животного.

Лекарственный препарат ФОРСЕКТО® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). При попадании в глаза вызывает раздражение. Препарат токсичен для пчёл, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат ФОРСЕКТО® применяют щенкам, собакам и кошкам для борьбы с эктопаразитами: блохами, вшами, власоедами, иксодовыми клещами, комарами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

12. Кошкам противопоказано применение препарата, предназначенного для собак.

Противопоказанием для применения является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Запрещается применение лекарственного препарата ФОРСЕКТО® больным инфекционными болезнями и ослабленным животным.

При совместном содержании собак и кошек не следует допускать контакта кошки с обработанной собакой до полного высыхания мест нанесения препарата на собаке.

13. При применении препарата следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки вымыть тёплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом ФОРСЕКТО®. В течение 48 часов после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом; при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае проявления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или упаковку).

14. Запрещается применение лекарственного препарата ФОРСЕКТО® кошкам и сукам в период беременности и вскармливания потомства, а также щенкам моложе 12-недельного возраста и/или массой менее 2,5 кг и котятм моложе 12-недельного возраста и/или массой менее 2 кг.

15. Упаковка лекарственного препарата ФОРСЕКТО® содержит две пипетки для обеспечения защиты от иксодовых клещей на сезон со средней продолжительностью 10 недель у кошек и 12 недель у собак и щенков; от вшей, блох и власоедов на период со средней продолжительностью 14 недель у кошек и 16 недель у собак и щенков.

Применение препарата у КОШЕК

ФОРСЕКТО® применяют путем точечного нанесения на сухую неповрежденную кожу животного.

При применении лекарственного препарата ФОРСЕКТО® кошкам надламывают кончик пипетки, раздвигают шерсть в области шеи, у основания черепа, нажимают на пипетку и наносят лекарственный препарат в одну или несколько точек.

Дозирование препарата осуществляется согласно таблице 1.

Таблица 1 – Дозирование лекарственного препарата ФОРСЕКТО® кошкам

Масса животного	Доза препарата (номинальный объём пипетки), мл	Доза действующих веществ, мг/кг массы животного	
		Этофенпрокс	Тебуфенпирад
Кошки			
от 2 до 4 кг	0,6	15-30,0	10-20
от 4 до 6 кг	0,9	15-22,5	10-15

При обработке кошек массой больше 6 кг препарат применяют из расчёта 0,15 мл/кг массы животного.

Не следует мыть и купать кошку в течение двух суток до и после обработки, а также наносить препарат на влажную или повреждённую кожу. Если кошку необходимо вымыть с шампунем, рекомендуется сделать это за двое суток до нанесения препарата.

Для получения оптимального защитного эффекта обработку следует проводить не позднее, чем за 48 часов до предполагаемого выгула кошек в

местах возможного обитания эктопаразитов.

Для повторной обработки используется вторая пипетка. Повторные обработки кошек проводят со средней частотой 1 раз в 5 недель против иксодовых клещей и 1 раз в 7 недель против блох, вшей и власоедов. Частота обработок может изменяться в зависимости от условий содержания кошки, биологических особенностей местной популяции эктопаразитов, погодных условий и др.

Применение препарата у СОБАК и ЩЕНКОВ

ФОРСЕКТО® применяют путем точечного нанесения на сухую неповрежденную кожу животного.

При применении лекарственного препарата ФОРСЕКТО® собакам и щенкам надламывают кончик пипетки, раздвигают шерсть в области спины (между лопатками), нажимают на пипетку и наносят лекарственный препарат на кожу в 3-4 места вдоль спины, от холки до хвоста.

Дозирование препарата собакам и щенкам осуществляется согласно таблице 2.

Таблица 2 – Дозирование лекарственного препарата ФОРСЕКТО® собакам и щенкам

Масса животного	Доза препарата (номинальный объём пипетки), мл	Доза действующих веществ, мг/кг массы животного	
		Этофенпрокс	Тебуфенпирад
Собаки и щенки			
от 2,5 до 5 кг	0,5	30-60	15-30,0
от 5 до 10 кг	1,0	30-60	15-30,0
от 10 до 20 кг	2,0	30-60	15-30,0
от 20 до 30 кг	3,0	30-45	15-22,5
от 30 до 40 кг	4,0	30-40	15-20,0

При обработке собак массой более 40 кг препарат применяют из расчёта 0,1 мл/кг массы животного, используя комбинацию пипеток различного объёма.

Для получения оптимального защитного эффекта обработку животного следует проводить не позднее, чем за 48 часов до предполагаемого выгула в местах возможного обитания эктопаразитов.

Не следует мыть и купать животное в течение двух суток до и после обработки после обработки, а также наносить препарат на влажную или повреждённую кожу. Если животное необходимо вымыть с шампунем, рекомендуется сделать это за двое суток до нанесения препарата.

Для повторной обработки используется вторая пипетка. Повторные обработки собак проводят со средней частотой 1 раз в 6 недель против иксодовых клещей и 1 раз в 8 недель против блох, вшей и власоедов. Частота обработок может изменяться в зависимости от условий содержания животного, биологических особенностей местной популяции эктопаразитов,

погодных условий и др.

При совместном содержании нескольких кошек и собак рекомендуется одновременно обрабатывать лекарственным препаратом ФОРСЕКТО® всех кошек и собак домохозяйства.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата ФОРСЕКТО® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении осложнений (избыточное слюноотделение, рвота), обработку прекращают, и препарат смывают водой с моющим средством на основе мыла. В редких случаях на месте нанесения препарата возможен зуд, покраснение кожи. Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки животного. При случайном попадании лекарственного препарата ФОРСЕКТО® на слизистые оболочки животного их необходимо обильно промыть тёплой водой. После промывания, при необходимости, применяются средства, снимающие раздражение.

17. При передозировке или попадании препарата в рот у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, угнетение, мышечная дрожь, рвота, неконтролируемые ритмичные движения глазных яблок. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством на основе мыла и назначают средства симптоматической терапии.

18. Сведения о несовместимости лекарственного препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют.

19. Особенности действия лекарственного препарата ФОРСЕКТО® при его первом применении и при его отмене не выявлено.

20. В случае пропуска очередной обработки её проводят в той же дозе, что указано в данной инструкции.

21. Лекарственный препарат ФОРСЕКТО® не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «НВП «Астрафарм»: 117246,
г. Москва, Научный проезд, дом 20,
стр. 3. Тел./факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм»: 117246,
г. Москва, Научный проезд, дом 20,
стр. 3, помещение I, комната 35.
Тел./факс: (495) 785-83-50/70.

Директор ООО «БиоФерон»



Е. В. Дьякова