

ЦИПРОВЕТ®

таблетки

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
ЦИПРОВЕТ® таблетки

Согласовано Заместитель Руководителя Россельхознадзора Власовым Н.А.
(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр.2).

Номер регистрационного удостоверения:
в России 77-3-1.15-4397№ПВР-3-11.9/02505 от 25.01.2019

I. Общие сведения

Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование – ЦИПРОВЕТ® таблетки (CIPROVET® tablets)

международное непатентованное наименование – ципрофлоксацин.

Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

ЦИПРОВЕТ® таблетки выпускают в двух дозировках – «ЦИПРОВЕТ® таблетки для собак» и «ЦИПРОВЕТ® таблетки для кошек и собак мелких пород», содержащих в качестве действующего вещества в 1 таблетке ципрофлоксацина гидрохлорид 50 мг и 15 мг соответственно, а также вспомогательные вещества: лактозу, лактулозу, стеарат кальция и поливинилпирролидон.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой двояковыпуклые таблетки массой 0,2 г, покрытые оболочкой от белого до серого цвета (таблетки для собак) или желтого цвета (таблетки для кошек и собак мелких пород).

Срок годности ЦИПРОВЕТ® таблеток при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 4 года со дня производства. Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 10 таблеток в блистеры, упакованные по 1, 2 или 3 штуки в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

Хранят ЦИПРОВЕТ® таблетки в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

ЦИПРОВЕТ® таблетки хранят в недоступном для детей месте.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

ЦИПРОВЕТ® таблетки относятся к группе антибактериальных средств.

Ципрофлоксацин, входящий в состав препарата – соединение группы фторхинолонов, обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Echerichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus* spp., *Yersinia* spp., *Haemophilus* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Pasteurella multocida*, *Plesiomonas shigelloides*, *Campylobacter jejuni*, *Brucella* spp., *Chlamydia trachomatis*, *Listeria monocytogenes*, *Mycobacterium* spp., *Corynebacterium diphtheriae*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.

Механизм действия ципрофлоксацина основан на блокировании фермента ДНК-гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактерии, что приводит к нарушению синтеза белка и быстрой гибели бактериальной клетки. Выражена бактерицидная активность на грамотрицательные микроорганизмы в период покоя и деления (т.к. влияет не только на ДНК-гиразу, но и вызывает лизис клеточной стенки), на грамположительные микроорганизмы - только в период деления.

Лактулоза, как пребиотическое вещество, усиливает рост полезных бактерий, таких как бифидобактерий и лактобактерий, и способствует подавлению роста потенциально патогенных бактерий, таких как *Clostridium* и *Escherichia coli*. Стимулирует перистальтику кишечника, улучшает всасывание фосфатов и солей Ca^{2+} , способствует выведению ионов аммония. Эти процессы ведут к нормализации микрофлоры в кишечнике, уменьшению образования аммиака.

После орального введения ципрофлоксацин легко всасывается в желудочно-кишечном тракте (преимущественно в двенадцатиперстной и тощей кишке), распределяется в органах и тканях организма (исключая ткани, богатые жирами), проникает в плевру, брюшину, лимфу, глазную жидкость и плаценту.

Максимальная концентрация ципрофлоксацина в сыворотке крови отмечается через 1,5-2 часа, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 24 часов после однократного перорального применения препарата.

Выводится ципрофлоксацин из организма в основном в неизменном виде и частично в форме метаболитов с мочой и желчью, у лактирующих животных - частично с молоком.

ЦИПРОВЕТ® таблетки по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают местно-раздражающего действия, не обладают эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

III. Порядок применения

ЦИПРОВЕТ® таблетки назначают собакам и кошкам с лечебной целью при острых и хронических болезнях бактериальной этиологии органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, желчных путей, мочеполовой системы, кожи, мягких тканей, костей и суставов, возбудители которых чувствительны к ципрофлоксацину.

Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, выраженные нарушения развития хрящевой или костной ткани, поражения нервной системы, сопровождающиеся судорогами.

При работе с ЦИПРОВЕТ® таблетками следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с ЦИПРОВЕТ® таблетками. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Не допускается применение ЦИПРОВЕТ® таблеток самкам в период беременности и лакта-

ции, щенкам и котятм до окончания периода роста.

Препарат применяют животным индивидуально перорально (внутрь) один раз в сутки на протяжении 3-5 дней в следующих дозах:

– кошкам и собакам мелких пород – 1 таблетка на 3 кг массы животного в дозировке «ЦИПРОВЕТ® таблетки для кошек и собак мелких пород»;

– собакам средних и крупных пород – 1 таблетка на 10 кг массы животного в дозировке «ЦИПРОВЕТ® таблетки для собак».

При применении ЦИПРОВЕТ® таблеток в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении побочных явлений (отказ от корма, рвота, отеки, нарушение координации движений), использование ЦИПРОВЕТ® таблеток прекращают и назначают десенсибилизирующую терапию.

При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, угнетенное состояние, рвота. В этом случае следует прекратить применение препарата и назначить антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Не следует применять ЦИПРОВЕТ® таблетки одновременно с бактериостатическими антибиотиками (левомицетином, макролидами и тетрациклинами), теофилином и нестероидными противовоспалительными средствами, а также с препаратами, содержащими катионы магния, алюминия и кальция, которые связываясь с ципрофлоксацином, препятствуют его адсорбции.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при отмене не выявлено.

Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной или нескольких доз, применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме применения.

ЦИПРОВЕТ® таблетки не предназначены для применения продуктивным животным.



Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

Телефон круглосуточной «горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).

Информация о подтверждении соответствия продукта размещена на сайте www.vetmag.ru