



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
**Секс-контроль С**

(организация-разработчик: Neoterica GmbH, Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany /  
Неотерика ГмбХ, Грилло штр. 18, 45141, Эссен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-4.12-3786№ПВР-3-5.6/01741

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Секс-контроль С.  
Международное непатентованное наименование: мегестрол.
2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.  
Секс-контроль С в 1 таблетке содержит в качестве действующего вещества мегестрола ацетат – 20 мг, в качестве вспомогательных веществ – лактозу, крахмал прежелатинизированный, стеарат магния, желатин и краситель Понсо 4R.
3. Препарат по внешнему виду представляет собой плоскоцилиндрические таблетки розового цвета с риской по центру массой 110 мг; возможны вкрапления, обусловленные особенностями используемого сырья.  
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня производства.  
Не применять по истечении срока годности.
4. Секс-контроль С выпускают расфасованным по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки и алюминиевой печатной лакированной фольги (блистер), которые индивидуально упаковывают в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.
5. Хранить препарат следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. Секс-контроль С следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: по рецепту ветеринарного врача.

**II. Фармакологические свойства**

9. Секс-контроль С относится к гормональным лекарственным препаратам.
10. Входящий в состав препарата синтетический гормон-прогестаген – мегестрола ацетат действует на гипоталамо-гипофизарную систему, блокируя

секрецию гонадотропных гормонов (фолликулостимулирующего и лютеинизирующего), препятствует развитию фолликулов, синтезу эстрогенов и появлению половой охоты. Применение препарата самкам до начала течки предотвращает овуляцию, а в начале фолликулярной фазы (первый-третий день течки) приводит к ее прекращению.

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и, как следствие, угнетает половую активность и связанные с ней поведенческие реакции.

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и в течение 48 часов выводится из организма животного с мочой.

Секс-контроль С по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности) согласно ГОСТ 12.1.007-76, в рекомендуемых дозах не оказывает тератогенного, сенсibiliзирующего и гепатотоксического действия.

### III. Порядок применения

11. Секс-контроль С назначают сукам для задержки и прерывания течки; кобелям – для снижения половой активности и коррекции поведения.

12. Не допускается применения Секс-контроля С при заболеваниях мочеполовой системы, онкологии и диабете.

13. При работе с Секс-контролем С следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Секс-контролем С. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Не допускается применения неполовозрелым животным, беременным и лактирующим сукам.

15. Препарат применяют животным перорально на корень языка за 1 – 2 часа до кормления. Доза препарата зависит от пола животного и цели применения.

Сукам Секс-контроль С применяют:

– для задержки течки за 7 – 15 дней до ее начала ежедневно, но не более 32 дней, в дозе 1/4 таблетки на 10 кг массы тела животного;

– для прерывания течки при появлении ее первых признаков, но не позже, чем через 3 дня от ее начала, в дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела животного. Первые 3 дня дают суточную дозу препарата, следующие 7 дней – суточную дозу снижают в два раза.

В течение года можно назначать не более двух курсов применения лекарственного препарата.

Кобелям препарат применяют для снижения полового возбуждения и

коррекции поведения в первые 7 дней в суточной дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела животного, в последующие 14 дней – суточную дозу снижают в два раза.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Секс-контроля С в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено. При длительном применении Секс-контроля С или повторных курсах приема возможно изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочной железы.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения.

АО «Научно-производственная  
фирма «Экопром»; Московская  
обл., г. Люберцы, рабочий поселок  
Томилино, ул. Гаршина, 11/33.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя.

АО «Научно-производственная  
фирма «Экопром»; Московская  
обл., г. Люберцы, рабочий поселок  
Томилино, ул. Гаршина, 11/23, пом.  
263.

Генеральный директор  
Neoterica GmbH, Германия

NEOTERICA GmbH  
Grillostrasse 18 45141  
Essen, Deutschland

С.Р. Бах