



ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата ЭНРОПРИМ®

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, ул. Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2.20-4613 №ПВР-3-15.14/03107

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: ЭНРОПРИМ® (ENROPRIM);
международное непатентованное наименование действующих
веществ: энрофлоксацин, триметоприм.

2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.

Лекарственный препарат содержит в 1 мл в качестве действующих
веществ: энрофлоксацин – 100 мг и триметоприм – 50 мг, а в качестве
вспомогательных веществ: молочную кислоту и воду очищенную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой жидкость от светло -
желтого до зеленовато-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий
хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства;
после первого вскрытия упаковки – 3 месяца. Запрещается применять препарат
по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 10 и 100 мл в полимерные
флаконы соответствующей вместимости, укупоренные навинчиваемыми
полимерными крышками с контролем первого вскрытия; по 1 л в полимерные
бутылки и по 5 л в полимерные канистры соответствующей вместимости,
укупоренные полимерными навинчиваемыми крышками с контролем первого
вскрытия.

Флаконы вместимостью 10 мл упаковывают поштучно в картонные пачки.
Каждая единица фасовки снабжается инструкцией по применению препарата.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. ЭНРОПРИМ® следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. ЭНРОПРИМ® относится к фармакотерапевтической группе фторхинолонов в комбинации.

10. Энрофлоксацин, входящий в состав лекарственного препарата, относится к соединениям группы фторхинолонов и обладает активностью в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium perfringens*, *Bordetella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Corynebacterium pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, а также *Mycoplasma spp.*

Энрофлоксацин подавляет бактериальную ДНК-гиразу, нарушает синтез ДНК, рост и деление бактерий; вызывает выраженные морфологические изменения (в том числе в клеточной стенке и мембранах), что приводит к быстрой гибели бактериальной клетки.

Триметоприм, входящий в состав лекарственного препарата, является производным соединением из группы диаминопиримидинов, механизм действия которого связан с угнетением бактериальной редуктазы дигидрофолиевой кислоты. Обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Shigella spp.*, *Haemophilus spp.* и *Chlamidia*.

При пероральном введении препарата энрофлоксацин и триметоприм быстро всасываются в желудочно-кишечном тракте и проникают в большинство органов и тканей. Максимальная концентрация энрофлоксацина в крови достигается через 1-2 часа, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 24 часов. Выводится энрофлоксацин из организма в основном в неизменном виде и частично в виде метаболита - ципрофлоксацина, преимущественно с мочой и желчью. Триметоприм создает высокую антибактериальную концентрацию в органах дыхания и мочеполовой системе птицы. Метаболизируется в печени, выводится из организма преимущественно почками, путем клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции. Период полувыведения триметоприма из организма животных составляет 8-10 часов.

ЭНРОПРИМ® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. ЭНРОПРИМ® применяют цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур и индейкам при колибактериозе, сальмонеллезе, хронических респираторных заболеваниях, стрептококкозе, некротическом энтерите, гемофилезе, микоплазмозе, смешанных инфекциях и вторичных инфекциях при вирусных болезнях, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину и триметоприму.

12. Противопоказанием к применению препарата ЭНРОПРИМ® является повышенная индивидуальная чувствительность птицы к энрофлоксацину и триметоприму. Запрещается применение лекарственного препарата ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением энрофлоксацина и триметоприма в яйцах и курам-несушкам, яйца которых предназначены в пищу людям.

13. При работе с препаратом ЭНРОПРИМ® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом ЭНРОПРИМ®. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. ЭНРОПРИМ® не предназначен для применения продуктивным млекопитающим животным.

15. ЭНРОПРИМ® применяют внутрь, путем выпаивания в суточной дозе 0,5-1 мл на 1 л питьевой воды в течение 3 суток; при сальмонеллезе, смешанных инфекциях, а также при хронических формах заболеваний - 5 суток.

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птиц в течение суток.

При приготовлении раствора ЭНРОПРИМ® необходимо добавлять в воду (а не наоборот).

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата ЭНРОПРИМ® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае возникновения аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают симптоматические лекарственные средства.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. ЭНРОПРИМ® запрещается применять совместно с бактериостатическими антибиотиками (левомецетином, макролидами и тетрациклинами), теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами, препаратами магния и кальция.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 11 суток после последнего применения препарата ЭНРОПРИМ®. Мясо птиц, вынужденно убитых до истечения установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование производственной производителя препарата для применения:	и адрес площадки лекарственного ветеринарного	ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево- Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1/11.
---	---	--

Наименование, организации, держателем регистрационного лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:	адрес и телефон уполномоченной или владельцем удостоверения круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93. Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru .
--	--

Генеральный директор
ООО «НВЦ Агроветзащита»



С.В. Енгашев