

ФЕБТАЛ®-КОМБО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата Фебтал®-комбо при нематодозах
и цестодозах собак и кошек
Согласовано заместителем Руководителя Россельхознадзора Власовым Н.А.
(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агробезопасит», г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1).

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Фебтал®-комбо (Febtal®-combo).

Международное непатентованное наименование действующих веществ: празиквантел, альбендазол.

Лекарственная форма: суспензия для орального применения.

Фебтал®-комбо в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: празиквантел – 5 мг и альбендазол – 50 мг, а в качестве вспомогательных веществ: нипагин, нипазол, лактозу, твин-80 и воду очищенную.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную суспензию от белого до светло-серого цвета. При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 1 год со дня производства, после первого вскрытия упаковки – 28 суток.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

Выпускают препарат расфасованным по 1; 2 и 5 мл в полимерные пипетки-капельницы, помещенные по 1; 2 или 3 штуки в картонные пачки; по 5, 7, 10, 20 мл в стеклянные и полимерные флаконы соответствующей вместимости, помещенные поштучно в картонные пачки. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению препарата.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С. Фебтал®-комбо следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

Фебтал®-комбо относится к комбинированным антигельминтным лекарственным препаратам. Входящие в его состав празиквантел и альбендазол обеспечивают широкий спектр антигельминтного действия препарата на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у собак и кошек, в том числе, *Toxascara canis*,

Toxascaris leonina, *Toxascaris mystax*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichocephalus vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Diphyllobotrium latum*, *Mesocostoides lineatus*.

Альбендазол – производное бензимидазола карбамата, активно в отношении имаго и личинок нематод желудочно-кишечного тракта, легких и трематод, а также имаго цестод; обладает овоцидным действием. Механизм действия связан с избирательным подавлением полимеризации бета-тубулина, что ведет к деструкции цитоплазматических микроканалцев клеток кишечного тракта гельминта; изменяя течение биохимических процессов, альбендазол подавляет утилизацию глюкозы и тормозит синтез АТФ, блокирует передвижение секреторных гранул и других органелл в мышечных клетках гельминтов, обуславливая их гибель.

При пероральном введении альбендазол плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, преобразуется в печени с образованием метаболитов альбендазола сульфоксида и затем альбендазола сульфона. Из организма выводится главным образом в виде метаболитов, в основном с желчью и частично с мочой, у лакирующих самок – также с молоком.

Празиквантел – соединение группы пиразинизохинолинов, активно в отношении половозрелых и неполовозрелых цестод; механизм его действия основан на индуцировании распада тегумента и ингибировании фумаратредуктазы, стойкой деполаризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель цестод и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта. Празиквантел быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 1-3 часа, распределяется в органах и тканях животного; связывается с сывороточными белками крови (70-80%), частично метаболизируется в печени, реэскретируется в кишечник, выводится из организма в основном с мочой (до 80%) в течение 24 часов.

Фебтал®-комбо по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности ГОСТ 12.1.007-76); LD₅₀ для белых мышей при пероральном введении составляет 3750 мг/кг; в рекомендуемых дозах не оказывает иммунотоксического, сенсибилизи-

рующего, эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится собаками и кошками разных пород и возраста.

III. Порядок применения

Фебтал®-комбо назначают собакам и кошкам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, трихоцефалез, анкилостомоз), цестодозах (тениидоз, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз) и ассоциативных нематодо-цестодозных инвазиях.

Противопоказанием к применению Фебтал®-комбо является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе, выраженные нарушения функции почек и печени. Не подлежат дегельминтизации истощенные, больные инфекционными болезнями животные.

Фебтал®-комбо применяют животным однократно, индивидуально, в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят принудительно на корень языка из расчета 1 мл суспензии на 1 кг массы животного.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется. Перед применением лекарственный препарат следует тщательно взболтать.

Для дегельминтизации животных массой менее 0,5 кг к отмеренной дозе препарата добавляют 0,3 мл холодной кипяченой воды, затем емкость тщательно встряхивают и вводят суспензию животному.

С лечебной целью дегельминтизацию собак и кошек проводят по показаниям, с профилактической – ежеквартально в терапевтической дозе (достаточно однократного применения), а также за 10-14 дней перед каждой вакцинацией.

При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта. В этих случаях применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

Фебтал®-комбо не следует применять беременным и кормящим самкам, а также щенкам и котятм моложе 3-недельного возраста.

При проведении дегельминтизации следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

При применении Фебтал®-комбо в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Фебтал®-комбо не следует применять одновременно с другими антигельминтными препаратами.

Фебтал®-комбо не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

При работе с препаратом Фебтал®-комбо следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Фебтал®-комбо. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Номер регистрационного удостоверения:

в РОССИИ 77-3-36.12-3619НеПВР-3-5.7/02022 от 21.03.2017
в ГРУЗИИ №000012 от 02.10.2012, №000377 от 04.09.2012
в КЫРГЫСТАНЕ №190 от 31.07.2014

в МОЛДОВЕ №1948 от 08.07.2013
в УКРАИНЕ АА-04986-01-13 от 18.12.2013



Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.
Телефон круглосуточной «горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).
Информация о подтверждении соответствия продукта размещена на сайте www.vetmag.ru

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Фебтала-комбо, утвержденная Россельхознадзором 30.01.2013 года.